

Ulotka: informacja dla pacjentki Microgynon

30, 0,15 mg/0,03 mg powlekane tabletki levonorgestrel /

etynyloestradiol Przeczytaj

dokładnie całą ulotkę zanim zażyjesz ten lek lekarstwo idzie używać, ponieważ jest ważne informacje w dla ciebie.

Zachowaj tę ulotkę. Może będziesz go później znowu potrzebować.

Czy u jeszcze pytania? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.

Nie podawaj tego leku nie innym osobom , ponieważ jest on tylko dla ciebie przepisany przepisany. Het może szkodliwy być dla innych, nawet jeśli mają oni takie same dolegliwości jak ty.

Czy masz objawy jednego z działań niepożądanych które w rubryce 4 są wymienione?

A może otrzymujesz Pan/Pani działanie niepożądane które nie w tej ulotce jest wymienione ? Proszę skontaktować się z swoim lekarzem lub farmaceutą ..

Ważne rzeczy które musisz wiedzieć o złożonych hormonalnych środkach antykoncepcyjnych:

Te środki stanowią jedną z najbardziej wiarygodnych odwracalnych metod antykoncepcji, pod warunkiem poprawnie używany

One dają nieco wyższe ryzyko powstania zakrzepu (zakrzepica) w żyłach i tętnicach) w żyły w tętnice, zwłaszcza w pierwszym roku gdy stosujesz złożony hormonalny środek antykoncepcyjny lub jeśli po przerwie 4 tygodni przerwanie z 4 tygodnie z dłużej ponownie zaczyna z stosowanie z jednym złożonym hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym

Zwróć uwagę na i skontaktuj się z swoim lekarzem jeśli masz myśli że Pan możliwe objawy zakrzepu krwi ma (patrz punkt 2 ' ZakrzepySkrzepy krwi zakrzepica')').W

tej ulotce ulotka:

1. Co to jest Microgynon 30 i do czego jest ten lek stosowany?
2. Kiedy nie wolno tego leku używać lub należy zachować szczególną ostrożność ostrożnie z być?
3. Jak używać Pan/Pani ten lek?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Pan/Pani ten lek?
6. Zawartość opakowania opakowanie i inne informacje

1. Co to jest Microgynon 30 i do czego jest ten lek stosowany?

Microgynon 30 to tabletki antykoncepcyjna pigułka antykoncepcyjna. Microgynon 30 jest używany do zapobiegania ciąży aby zapobiec.

Pigułki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony zawierają są 'pigułkami złożonymi' nazywane. Dwa różne żeńskie hormony są levonorgestrel (hormon z działaniem podobnym do progesteronu) i etynyloestradiol etynyloestradiol hormon z działaniem estrogennym). Tabletki antykoncepcyjne). Tabletki antykoncepcyjne z dwoma hormonami są bardzo wiarygodne. Jeśli one poprawnie są przyjmowane (bez pominięcia tabletek są zapomniane) jest szansa na ciążę bardzo mały.

2. Kiedy nie wolno tego leku nie używać lub musisz być szczególnie ostrożny z tym być?

Ogólne uwagi

Przeczytaj zanim Pan(i) zacznie stosować Microgynon 30, proszę przeczytać informacje o zakrzepach krwi (zakrzepica) w sekcji 2. Jest to szczególnie ważne aby Pan(i) że u czyta jakie objawy są zakrzepu krwi zakrzep zobacz sekcję 2 ' ZakrzepySkrzepy krwi tromboza)'.Zanim

możesz zacząć z leczeniem z użycie z Microgynon 30, będzie twój lekarz ci kilka pytań zada o twojej osobistej historii chorób historia choroby tej twojej bliskiej rodziny członków. Lekarz będzie również Twoje ciśnienie krwi mierzyć i, w zależności od Twojej osobistej sytuacji, możliwe również inne badania przeprowadzić robić.

W tej ulotce są opisane różne sytuacje w których należy przestać stosować z używanie z Microgynon 30 lub w których de wiarygodność z Microgynon 30 zmniejszona może być. W takich sytuacjach należy Pan albo nie uprawiać seksu ,albo stosować dodatkowe środki antykoncepcyjny bez bez hormony używać, takie jak na przykład prezerwatywa lub inna metoda barierowa . Nie stosujmetody temperaturowej ani okresowej abstynencji . okresowe abstynencja. Te metody mogą być niewiarygodne ponieważ Microgynon 30 miesięczne zmiany z temperatury ciała i to śluzówki szyjki macicy wpływa.

Podobnie jak inne środki antykoncepcyjne z hormonami chroni Microgynon 30 nie przed zakażeniem wirusem HIV-wirusem (AIDS) lub innymi seksualnie przenoszonymi chorobami (STD).

Kiedy nie wolno tego leku nie stosować?

Nie wolno tego leku stosować jeśli masz jedną z poniżej wymienionych chorób . Jeśli masz jednąz jeden lub więcej z poniżej wymienionych schorzeń ma, powiedz to wtedy swojemu lekarzowi. Twój lekarz omówi z tobą omówić omówić który inne forma z antykoncepcji bardziej odpowiednia jest dla ciebie.

Używaj Microgynon 30 nie:

jeśli masz zakrzep zakrzep jednym z naczynie krwionośne z nóg (głębokie żyłne zakrzepica, DVT), płuc (zatorowość płucna, PE) lub inny narząd miał, lub to w przeszłości miał miał
jeśli Pan/Pani wie że Pan/Pani ma zaburzenie które wpływa na Pana/Pani krzepnięcie krwi wpływa – na przykład niedobór białka C, białka S-niedobór, antytrombina III-niedobór, czynnik V-Leiden lub przeciwciała przeciw fosfolipidom
jeśli jesteś operowany musisz być lub przez długi czas nie jesteś na nogach (zobacz rubryka 'Zakrzepy krwi (zakrzepica)')
jeśli kiedykolwiek miałeś zawał serca lub udar miałeś jeśli masz dławicę piersiową (choroba dławica piersiowa (jeden choroba które silny ból w klatce piersiowej powoduje i pierwszy objaw zjawisko zawału serca może być) lub przemijającyatak niedokrwieny przemijający niedokrwienna atak ma (TIA – przemijające objawy udaru udaru), lubto kiedykolwiek ma miał jeśli

masz jedną z następujących chorób , które ma, które ryzyko na jeden zakrzep w twoich tętnicach mogą zwiększać:

- o ciężka cukrzyca (cukrzyca) z uszkodzeniem naczyń krwionośnych ciężko
- o podwyższone ciśnienie krwi ciśnienie krwi
- o jeden poważny podwyższony poziom tłuszczów w twojej krwi (cholesterol lub triglicerydy)
- o choroba która hiperhomocysteinemia jest nazywana jeśli

masz jeden rodzaj migreny migrena typu że 'migrena z aurą' jest nazywana ma (lub miał miał)

jeśli masz ciężką chorobę wątroby lub żółtaczkę , lub w przeszłości miał przeszłość ma miał

jeśli Pan guz w wątrobie ma , lub miał jeśli Pan rak piersi

lub rak narządów płciowych rak do de narządy płciowe ma, lub w przeszłości ma miał

jeśli masz nietypowe krwawienia z pochwy masz, których przyczyna nie została ustalona jeśli

jako u alergiczny jesteś na jeden z substancji w tym leku. Te substancje możesz znaleźć w sekcji rubryce 6.

Stosowanie Microgynon 30 nie jeśli masz zapalenie wątroby typu C masz i w tym celu leki z ombitasvirparitaprevirritonavir, dasabuvir, glecaprevirpibrentasvir lub sofosbuvirvelpatasvirvoxilaprevir używany (zobacz także sekcja 2 'Używasz ty inne leki ?').Kiedy

musisz być dodatkowo ostrożny być z tym to środek?

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem? twoim lekarzem?

Wezwij natychmiast pomoc medyczną w

- przypadku gdy możliwe dolegliwości lub objawy z jednego zakrzepu krwi zauważony, które mogą oznaczać że cierpisz na zakrzep w zakrzep krwi w twojej nodze (tzn.. głębokiej żyłnej zakrzepica), jeden zakrzep w twoim płucu (tzn.. zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz poniżej zobacz de de rubryka 'Zakrzepy krwi (zakrzepica)').

Idź do opisu tych dolegliwości lub objawów tych tych poważnych działań niepożądanych do 'Jak Jak rozpoznaje pan/pani krzepnięcie krwi ?'.Powiedz

to swojemu lekarzowi, jeśli jedna z następujących sytuacji dotyczy pana/pani jest. Skontaktuj się z swoim

lekarzem lub swoim lekarzem lub farmaceutą zanim Pan(i) ten lek użyje. W niektórych sytuacjach musi Pan(i) dodatkowo ostrożny być jeśli Pan(i) Microgynon 30 lub inną kombinowaną tabletkę antykoncepcyjną używany. To może być konieczne że Pan/Pani regularnie przez swojego lekarza jest kontrolowany. Jeśli choroba wystąpi, lub pogorszy się, podczas u Microgynon 30 używasz, musisz u to również do swojego lekarza powiedzieć.

Jeśli palisz.

Jeśli masz cukrzycę (cukrzyca) ma.

Jeśli masz dużo za dużo wagi.

Jeśli masz jakieś podwyższone ciśnienie krwi ma.

Jeśli masz jakieś schorzenie zastawek serca lub jakieś określone arytmia ma.

Jeśli ktoś w twojej bliskiej rodzinie kiedykolwiek zakrzepicę, zawał serca lub udar mózgu miał mieć przeszłość.

Jeśli masz problemy z migreną.

Jeśli masz padaczkę ma (zobacz 'Czy używasz innych leków?'). Jeśli ktoś w twojej rodzinie twój bezpośrednia rodzina kiedykolwiek rak piersi ma miał.

Jeśli masz jakieś schorzenie wątroby lub pęcherzyka żółciowego masz.

Jeśli masz chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalny choroba jelit) ma

Jeśli masz układowy toczень rumieniowaty układowy (SLE – chorobę która która twój naturalny układ odpornościowy uszkodza) ma.

Jeśli masz zespół hemolityczno-mocznicowy syndrom (HUS – jeden zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek) ma. Jeśli masz.

(dziedziczną chorobę czerwonych krwinek) czerwonej komórki krwi) ma.

Jeśli masz podwyższony poziom tłuszczów we krwi

(hipertriglicerydemia hipertriglicerydemia lub jeśli to schorzenie występuje w twojej rodzinie rodzina dla of is in twój rodzina wystąpił. Hipertriglicerydemia jest w związku przyniesiony z jednym wyższe ryzyko na zapalenie trzustki (jednym zapalenie trzustki trzustka do herapeutische indicaties: Dit geneesmiddel is geïndiceerd voor de behandeling van hypertensie en angina pectoris. Dosering en toediening: De aanbevolen startdosering is 5 mg eenmaal daags. De dosering kan worden verhoogd tot een maximum van 10 mg per dag, afhankelijk van de respons van de patiënt.

Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de

hulpstoffen. Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding: Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding, tenzij strikt noodzakelijk.

Bijwerkingen: De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Interacties: Gelijktijdig gebruik met andere antihypertensiva kan het

bloeddrukverlagende effect versterken. Bewaarcondities: Bewaren bij een temperatuur beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

otrzymać.

Jeśli operowany musisz być lub jesteś przez długi czas nie na nogach (patrz 'Zakrzepy krwi' w sekcji 2).

Jeśli niedawno urodzić jesteś, ma Pan/Pani podwyższone ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi . Zapytaj swojego. szybko po porodzie Pan/Pani na de poród u mozesz rozpocząć stosowanie używania z Microgynon 30.

Jeśli masz zapalenie żył w żyłach tuż pod skórą (powierzchowne zakrzepowe zapalenie żył zakrzepowe zapalenie żył) ma

Jeśli masz żylaki ma.

Jeśli masz ostudę ma lub ma kiedykolwiek ostudę miał (żółto-brązowe plamy pigmentacyjne, tak zwane 'plamy ciążowe', zwłaszcza w twarzy); jeśli to jest przypadek , to jest rozsądne aby bezpośrednie narażenie na światło słoneczne lub ultrafioletowe światło unikać ..

Jeśli objawy obrzęku naczynioruchowego wystąpią, takie jak opuchnięta twarz , języki wi w problemy z przełykaniem lub pokrzywka czyraki możliwe razem z problemami z oddychaniem, skontaktuj się natychmiast z twoim lekarzem. Produkty które estrogenne hormony zawierają, mogą możliwe objawy objawy z dziedziczny i nabyty angio-obrzęk powodować lub pogarszać.

ZAKRZEPY KRWI (TROMBOZA)

Jeśli używasz złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Microgynon 30 30 „, ma pan(i) większe ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi niż gdyby nie stosował(a) złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego . W rzadkich przypadkach. W rzadko występujące przypadki może jeden zakrzep krwi jeden naczynie krwionośne zablokować i poważne problemy powodować.

Zakrzepy krwi mogą powstawać

w żyłach (to nazywa się 'żylna zakrzepica', 'żylna zakrzepowo-zatorowa' lub VTE nazywana),

w tętnicach (to nazywa się 'tętnicza zakrzepica', 'tętnicza zakrzepowo-zatorowa' of ATE nazywany).

Człowiek wraca do zdrowia nie zawsze całkowicie z zakrzepów krwi. W rzadko występujących przypadkach mogą wystąpić długotrwałe poważne skutki być, lub w bardzo rzadko występujących przypadkach mogą skrzepy krwi śmiertelne być.

Ważne jest ważne że Pan/Pani wie że ogólne ryzyko całkowite na jeden szkodliwy zakrzep krwi przez Microgynon 30 mały jest.

JAK ROZPOZNAĆ ZAKRZEP KRWI?

Skontaktuj się z nagłą pomocą medyczną w przypadku gdy jeden z następujących objawów z objawy zauważysz.

Czy masz u jeden z tych dolegliwości lub objawy?

obrzęk z jednej nogi lub wzdłuż jednej żyły w jednej nogi lub stopy, zwłaszcza jeśli to wiąże się z z:

Gdzie możesz u cierpieć ?obrzęk
Głębokie żyłne zakrzepica

ból lub wrażliwość nogi, która
możesz ewentualnie tylko odczuwać przy staniu lub chodzeniu
podwyższona
temperatura temperatura dotkniętej
nodze zmiana koloru
zmiana koloru z skóry z
nogi, na przykład blady, czerwony lub
niebieski stać się

nagła niewyjaśniona duszność Zatorowość płucna
lub szybkie oddychanie
nagły kaszel bez wyraźnego
przyczyna, przy której u krew możesz odkrztuszać
ostry ból w klatce piersiowej, który może się
pogorszyć gdy głęboko oddychasz poważny
poważny lekki uczucie w głowie lub
zawroty głowy
szybkie lub nieregularne bicie serca
silny ból w Twoim żołądku.

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem lekarz, ponieważ niektóre z tych objawów, takich jak kaszel lub duszność, mogą błędnie być uznane

za łejsze przypadki choroby choroba, takie jak infekcja dróg oddechowych (np. przeziębienie).

Objawy występują zwykle w jednym oku : Zakrzepica żylna w
natychmiast utrata wzroku widzenia, siatkówka (zakrzep w
lub oku)
bezbolesne zamglone widzenie, co może się rozwinąć
do utraty z widzenia

ból, dyskomfort, ucisk lub ciężkie uczucie na Zawał serca
klatka piersiowa
ucisk lub pełne uczucie w klatce piersiowej, ramieniu lub dolnej
mostek uczucie
pełności niestrawność lub duszność dyskomfort w górnej części ciała promieniujący do
pleców,
szczęki, gardła, ramienia i promieniuje do
plecy, szczęką, gardło, ramię w żołądek
pocić się, nudności, wymioty lub
zawroty głowy
ekstremalna słabość, lęk lub duszność
szybkie lub nieregularne tętno

nagła słabość lub drętwienie uczucie z Udar
twarz, ramię lub noga, zwłaszcza po jednej stronie
ciała nagła
dezorientacja dezorientacja trudności z mówieniem lub
rozumieniem nagła
nagły trudności z widzeniem w jednym lub obu oczach
nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy,
utrata równowagi lub koordynacji koordynacja
nagły, poważny lub długotrwały ból głowy
bez znanej przyczyny
obniżona świadomość lub omdlenie z lub
bez napadu padaczkowego.

Objawy objawy z jeden udar mogą czasami tylko krótko trwać i prawie bezpośrednio i
całkowicie wyzdrowieć. Jednak należy wtedy mimo to nagła medyczna pomoc wezwać,
ponieważ masz szansę możesz mieć na kolejny udar dostać . obrzęk i.

siniać w łagodne sinica z jeden ramię Zakrzepy które inne
lub noga naczynia krwionośne zatykać
poważny ból w twoim brzuch (ostry brzuch)

ZAKRZEPY W ŻYŁE

Co może er zdarzyć się jeśli er jeden zakrzep krwi jest utworzony w jeden żyła?
Stosowanie stosowanie z złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest w związek
przyniesiony z większym ryzykiem zakrzepów w żyłach (zakrzepica żylna).Te
działanianeopóźdane występują jednak rzadko jednak rzadko dla. Zwykle występują

one w pierwszym roku gdy jest złożony hormonalny środek antykoncepcyjny jest stosowany.

Jeśli powstanie zakrzep zostanie utworzony w żyła żyła w nodze lub stopie, może to prowadzić do głębokiej zakrzepicy żyłnej (DVT) powodować.

Jeśli zakrzep krwi z nogi jest przenoszony i w płucu trafia, może to spowodować zator płucny powodować.

zdarza się bardzo rzadko , że zakrzep krwi zakrzep jest utworzony w żyła w innym narządzie , takim jakoko (zakrzepica żylna wsiatkówce). Kiedy siatkówka).

Kiedy jest ryzyko zakrzepu w naczyniu krwionośnym w naczyniu żylnym najwyższe ?Ryzyko

zakrzepu w naczyniu krwionośnym zakrzep naczyniu żylnym jest najwyższe najwyższy w pierwszym roku gdy kobieta po raz pierwszy używa złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego . Ryzyko może również być zwiększone też podwyższony są jeśli Pan/i po jednym przerwaniu na 4 tygodnie lub dłużej ponownie zaczyna stosowanie używania środka jednego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (to samo produkt, lub inny produkt niż wcześniej).Po

pierwszym roku ryzyko staje się mniejsze , ale pozostaje wyższe niż coś wyższy następnie jeśli u nie złożony hormonalny środek antykoncepcyjny stosujesz.

Jeśli przestaniesz stosować z Microgynon 30, to twoje ryzyko wystąpienia zakrzepu w ciągu kilku dni tygodnie ponownie normalny.

Jak wysokie jest ryzyko wystąpienia zakrzepu zakrzep krwiRyzyko

zależy od Twojego naturalnego ryzyka twój Twojego naturalnego ryzyka na VTE, i typu złożony hormonalny środek antykoncepcyjny który używasz stosujesz.

Ogólne ryzyko zakrzepicy w jednej krwi w nodze lub płucu (głębokiejgłęboka żylna zakrzepica lub zatorowość płucna) z Microgynon 30 jest małe.

- Na każde 10.000 kobiet które nie żadne złożone hormonalne środek antykoncepcyjny stosują en nie w ciąży być, dostają około 2 na okres jeden rok krwiak . Z każdego 10.000.
- Od każdy 10.000 kobiety które stosują złożony hormonalny środek antykoncepcyjny używają który zawiera levonorgestrel zawiera takie jak Microgynon 30, otrzymują około około 5-7 w okresie okresie z jeden rok jeden zakrzep krwi.
- Ryzyko ryzyko na jeden zakrzep krwi dostać jest zależne od twojej osobistej medycznej historii chorób (zobacz rubryki 'Czynniki które Twoje ryzyko zakrzepicy w naczyniu krwionośnym w naczyniu żylnymtętnicznym zwiększają' poniżej)

Ryzyko wystąpienia w jeden rok jeden zakrzep krwi dostać się

Kobiety które nie złożone hormonalne tabletki używają i nie są w ciąży są

Okolo 2 na każde 10.000 kobiet

Kobiety które stosują tabletkę złożoną używają która

Okolo 5-7 na każde

levonorgestrel zawiera

10.000 kobiet

Kobiety które Microgynon 30 stosują

Około 5-7 z każdej
10.000 kobiet

Czynniki które Twoje ryzyko zakrzepicy krwi zakrzep żyły zwiększają Ryzyko zakrzepicy

krwi w żyłę zwiększa zakrzep krwi met Microgynon 30 is małe, maar er są pewne okoliczności które ryzyko zwiększają. Twoje ryzyko jest wyższe:

jeśli masz poważny nadwaga ma (BMI [wskaźnik masy ciała] wyższy niż 30 kg/m²)

jeśli jeden z twoich bliskich krewnych w młodym wieku (na przykład przed przed het 50^e rok) jeden zakrzep krwi miał mieć w jednej nodze, płucu lub innym narządzie. W takim przypadku możesz mieć dziedziczny problem zaburzenie krzepnięcia mieć.

jeśli Pan operację musi przejść , lub jeśli Pan długi czas nie na nogach z powodu urazu lub uraz z choroba, lub jeśli twój noga w gipsie jest. To może być konieczne aby przed operacją , lub kiedy jesteś mniej ruchliwy , kilka kilka tygodnie do przerwać z używaniem z Microgynon 30. Jeśli musisz przerwać stosowanie Microgynon 30, zapytaj swojego lekarza twój kiedy możesz znowu ponownie możesz rozpocząć z używaniem.

jeśli jesteś starszy stajesz się (w szczególności około powyżej 35 lat)

jeśli w ostatnich tygodniach poród jesteś.

To ryzyko na jeden zakrzep krwi wzrasta w miarę jak jest więcej z tych warunków dotyczy ciebie stosuje się.

Podróż samolotem samolot (dłużej niż 4 godziny) może Twoje ryzyko zakrzepicy tymczasowo zwiększyć , zwłaszcza jeśli są jeszcze kilka innych czynników inne z wymienionych okoliczności na ciebie z zastosowanie mają.

Ważne jest, ważne że powiesz to twój lekarzowi powiedz jeśli jeden lub więcej z tych okoliczności na ciebie mają zastosowanie są, nawet jeśli ty o tym wątpisz. Twój lekarz może zdecydować że ty musisz przestać z użycie z Microgynon 30.

Jeśli jeden z powyżej wymienionych okoliczności zmienia się podczas używania Microgynon 30 przez Ciebie, na przykład jeśli jeden obok krewny jeden zakrzep krwi (zakrzepica) dostaje bez znanej przyczyny, lub jeśli masz dużo na wadze przybierasz, powiedz to niżej do twojego lekarza.

ZAKRZEP KRWI W TĘTNICY

Co może się stać jeśli się utworzy zakrzep zostanie utworzony w tętnicy ??

Net jak skrzep krwi w żyłę ,może skrzep krwi zakrzep tętnicy powodować poważne problemy . Może na przykład. To może na przykład jeden zawał serca lub jeden udar powodować.

Czynniki które twoje ryzyko zakrzepu krwi w jeden zakrzep w jeden tętnica

zwiększają To jest że wiesz że że ryzyko zawału serca lub udaru przez stosowanie Microgynon 30 jest bardzo małe, 30 większe mały jest, ale większy może być:

z wzrastającym wiekiem (powyżej około 35 lat)

jeśli palisz . Jeśli stosujesz złożony hormonalny środek antykoncepcyjny jak Microgynon 30 używany, zaleca się że Pan przestanie palić . Jeśli Pan nie może przestać palić i starszy palenie w starszy masz powyżej 35 lat, może twój lekarz ci zalecić aby inny rodzaj antykoncepcji stosować jeśli masz nadwagę jeśli masz nadwagę jeśli masz wysokie ciśnienie krwi ma jeśli członek rodziny twojej bliskiej rodziny w młodym wieku (przed 50^{ty}m rokiem) zawał serca of udar miał przeszedł. W takim przypadku możesz mieć również zwiększone ryzyko posiadać na zawał serca lub udar mieć udar do otrzymać jeśli ty, lub członek twojej bliskiej rodziny ,ma podwyższony poziom tłuszczów we krwi (cholesterol lub triglicerydy triglicerydy jeśli ty u na migrena cierpi, szczególnie migrena z aurą jeśli Pan/Pani ma chorobę serca (choroba zastawkowa serca, lub zaburzenie rytmu serca które migotanie przedsionków jest nazywane jest wymieniony) jeśli masz cukrzycę (diabetes) masz.

Jeśli więcej niż jeden z tych warunków dotyczy ciebie zastosowanie ma, lub jeśli jeden z te schorzenia szczególnie poważny jest, może to ryzyko wystąpienia otrzymania z jednego zakrzepu krwi nawet jeszcze bardziej zwiększone być.

Jeśli jeden z powyżej wymienionych okoliczności zmienia się podczas używania Microgynon 30 stosujesz, na przykład jeśli zaczynasz palić lub jeśli of jeśli jeden obok członek rodziny jeden zakrzep krwi (zakrzepica) dostaje bez znanej przyczyny, lub jeśli masz dużo na wadze przybierasz, powiedz to wtedy do swojego lekarza.

Microgynon 30 i rak

U kobiet które tabletki używają jest nieco częściej rak piersi stwierdzany niż u kobiet nieużywających pigułek w tym samym wieku. Dziesięć lat po zaprzestaniu stosowania pigułki nie ma żadnej różnicy . Nie jest znane znany z to różnica jest spowodowana przez pigułkę. To może również wynikać ponieważ użytkowniczki pigułek dokładniej i częściej są badane, aby de rak piersi wcześniej zostaje wykryty. Jak wcześniej de rak zostaje wykryty, jak lepsze de wyniki leczenia leczenia.

W rzadkich przypadki są u użytkowniczek pigułek łagodne guzy wątroby znalezione i w jeszcze rzadszych przypadkach złośliwe guzy wątroby. Czasami te guzy prowadziły do do jeden zagrażający życiu wewnętrzny krwotok. Jeśli masz nagle problemy z silnym bólem brzucha , to musisz natychmiast skontaktować się natychmiast lekarzem lub szpitalem twój lekarz.

U kobiet które tabletki przez dłuższy czas stosowały jest nieco częściej rak szyjki macicy stwierdzany . Tonie musi jednak oznaczać nie przez pigułka do przyjść ale może do zrobić mieć z seksualne zachowanie i inne czynniki. Jest jeszcze nie jasne jak duży de wpływ tego jest na zachorowanie na raka szyjki macicy. Jest dobrze wiadomo że de główną przyczyną raka szyjki macicy jest długotrwała infekcja infekcja z tak zwanym ludzkim wirusem brodawczaka (HPV).

Zaburzenia psychiczne

Niektóre kobiety które hormonalne środki antykoncepcyjne w tym Microgynon 30 stosują, zgłosiły przypadki wystąpienia z depresja lub przygnębienie. Depresja może być poważna i może czasami prowadzić do myśli samobójczych . Jeśli masz wahania nastroju objawy

depresji objawy z depresja doświadczają, skontaktuj się jak najszybciej możliwie szybko skontaktuj się z swoim lekarzem w celu dalszej porady medycznej.

Krwawienie międzyokresowe

Przy wszystkich tabletkach może w pierwszych kilku miesiącach czasami nieoczekiwany krwawienie wystąpić (plamienie lub krwawienie przełomowe). Pani może wtedy może nie bez podpaski. Proszę w każdym przypadku normalnie swój tabletki przyjmować. nieregularne krwawienie zwykle ustaje gdy twoje ciało raz przyzwyczai się do danej tabletki de dotyczące pigułka (na około 3 paski). Jeśli dłużej trwa, gorzej się stanie lub ponownie zacznie ,należy skontaktować się z swoim lekarzem. swój lekarz

Co należy zrobić jeśli nie wystąpi krwawienie podczas dni bez tabletek Jeśli wszystkie tabletki zostały prawidłowo przyjęte , niema problemów z ma miał z wymioty i również żadnych innych leki ma używał, jest to wysoce nieprawdopodobne że jesteś w ciąży . Ty możesz wtedy spokojnie z następnym paskiem kontynuować.

Jeśli oczekiwane krwawienie jednak dwa razy z rzędu nie wystąpi możesz być w ciąży . Skontaktuj się. Weź natychmiast skontaktuj się z swoim lekarzem. Nie kontynuuj z następnym opakowaniem Microgynon 30 30 swój lekarz stwierdzi że nie jesteś w ciąży w ciąży bent.

Użycie u dzieci

Microgynon 30 jest nie przeznaczony dla kobiet które jeszcze nie miesiączkują.

Użycie u starszych kobiet

Microgynon 30 musi nie używany być po de menopauzie.

Używasz ty jeszcze inne leki?

Używasz ty oprócz Microgynon 30 jeszcze inne leki, lub czy Pan/Pani to niedawno zrobił(a) lub istnieje możliwość że możliwość najbliższej przyszłości inne leki inny leki idzie używać? Powiedz to wtedy swojemu lekarzowi lub farmaceucie. Oni mogą ci powiedzieć czy jest konieczne aby podjąć dodatkowe środki antykoncepcyjne podjąć podjąć (na przykład prezerwatywy) i, jeśli to to przypadek jest, jak długo należy to robić ..

leki mogą mieć wpływ na mieć na poziomy we krwi z Microgynon 30 i mogą ochrona przed ciążą zmniejszyć , lubmogą nieoczekiwane krwawienie powodować . Todotyczy tego przypadku o:

leki na de leczenie z

- o padaczki (na przykład primidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramata lub felbamata)
- o gruźlicę (na przykład ryfampicyna)
- o infekcje z HIV- i wirus zapalenia wątroby typu C (tak zwane inhibitory proteazy i nie-nukleozyd zakażenia grzybicze (ritonawir, newirapina, efawirens).
- o zakażenia grzybicze (gryzeofulwina)
- o zapalenie stawów, artroza (etorykoksyl)
- o wysokie ciśnienie krwi w naczyniach płucnych (bozentan).

ziołowy środek dziurawiec zwyczajny dziurawiec zwyczajny.

30 30 może de działanie innych leków wpływać wpływać na przykład leki zawierające cyklosporynę zawierają lek przeciwpadaczkowy

lamotrygina (to może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia działania liczba napady)
teofilina (jest stosowany w leczeniu leczenia z problemów z oddychaniem)
tyzanidyna (jest stosowana w leczeniu leczenia z ból mięśni i/lub skurcze mięśni).

Stosuj Microgynon 30 nie jeśli masz zapalenie wątroby typu C i przyjmujesz leki leki ombitasvirem

/parytaprewiremparytaprewir/ritovanir, dasabuvir, glecaprevirpibrentasvir of sofosbuvirvelpatasvirvoxilaprevir używany, ponieważ te leki mogą powodować wzrost enzymu wątrobowego ALAT (jeden badanie krwi na funkcję wątroby) mogą powodować. Twój lekarz przepisze ci inne środek antykoncepcyjny przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem z leczenie z ten leki. Microgynon 30 może około 2 tygodnie po zakończeniu tej tej leczenia być wznowione. Zobacz sekcja 2 'Kiedy czy możesz ten lek nie używać?'.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli jesteś w ciąży , lub myślisz że jesteś w ciąży mogłabyś być , nie możesz, możesz Microgynon 30 nie używać.

Stosowanie Microgynon 30 jest 30 nie zalecane tak długo, jak kobieta karmi piersią jeden kobieta karmienie piersią daje. Jeśli pigułkę jednak chcesz używać podczas karmienia jeszcze piersią ,możesz najlepiej skontaktować się z swoim lekarzem. Twoim lekarzem. Zdolność prowadzenia pojazdów

Zdolność prowadzenia pojazdów en het użycie maszyn

Nie ma żadnych wskazań że zdolność prowadzenia pojazdów jest wpływana ..

30 30 sacharoza i laktoza laktoza

Jeśli twój lekarz cię poinformował że nie tolerujesz pewnych cukrów , skontaktuj się z twoimlekarzem zanim zażyjesz ten lek . lekarstwo przyjmuje.

3. Jak stosować ten lek ?Stosuj

ten lek zawsze dokładnie tak, jak twój lekarz ci to powiedział . Masz wątpliwości. tego ? właściwe użycie? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy i jak przyjmujesz tabletki ? Blister

zawiera 21 21 . W przypadkukażdego każdy tablet stan wskazany na który dzień ten musi być przyjęty. Przyjmuj tabletki każdego dnia mniej więcej o tej samej porze , w razie potrzeby z wodą. Postępuj zgodnie z kierunkiem strzałki na pasku wskazanym aż do przyjęcia wszystkich 21 tabletek . Następnie nie przyjmuj. dni żadnej tabletki. W trakcie tych dni nie przyjmuj 7 dni powinno krwawienie się rozpocząć (tzw. krwawienie z odstawienia).To zwykle zaczyna się w 2 i^{lub} 3 ^{dn} po na de ostatnia tabletki Microgynon 30. Rozpocznij 8^{ego} dnia z następnym opakowaniem, niezależnie czy krwawienie już minęło czy nie. To oznacza że zawsze w ten sam dzień tygodnia z następnym opakowaniem rozpoczynasz ,i również to że krwawienie z odstawienia każdego miesiąca mniej więcej w te same dni dni upada.

Jeśli Microgynon 30 w ten sposób używasz, jesteś również podczas 7 dni gdy nie przyjmujesz tabletki chroniona przed ciążą ciąża.

Kiedy zacząć stosować pierwszą tabletkę? pasek?

Jeśli nie stosowałaś w ciągu ostatniego miesiąca żadnej tabletki antykoncepcyjnej Rozpocznij stosowanie Microgynon 30 w pierwszym dzień z cyklu (pierwszy dzień z twojej menstruacji). Weź jedną tabletkę przy odpowiednim oznaczeniu dnia na pasku. Możesz również na pasku. Możesz dzień na dzień 2-5 dnia cyklu rozpocząć ale wtedy musisz w pierwszych siedmiu 7 dniach należy użyć dodatkowego środka antykoncepcyjnego (na przykład prezerwatywę) użyć ..

Przełączanie z innej kombinowanej pigułki pigułka złożona pierścienia dopochwowego antykoncepcyjnego lub plastra antykoncepcyjnego Możesz rozpocząć z Microgynon 30 w dniu po dniu po zakończeniu ostatnia tabletki z twojego poprzedniego pigułka została przyjęta (więc bez przerwy). Jeśli przy twojej poprzedniej pigułce również nieaktywne tabletki w opakowaniu siedzieć, musi Pan/i natychmiast kontynuować po ostatniej aktywnej tabletki z swojego poprzedniego opakowania (jeśli Pan/i nie wie która które że jest, zapytaj wtedy swojego lekarza lub farmaceuty). Możesz również później rozpocząć, ale nigdy później niż w dzień po zakończeniu okresu bez tabletek beztabletkowy okres z twój poprzedni pigułka (lub po ostatniej nieaktywnej tabletki z twojego poprzedniego pigułka). Jeśli masz pierścień dopochwowy antykoncepcyjny lub plaster antykoncepcyjny posiadasz ma używa, musi Pan/Pani najlepiej zacząć od stosowania Microgynon 30 w dzień usunięcia ostatniego pierścienia lub plastra z ostatni pierścień plaster z jeden opakowanie cyklu, ale nie później niż w dzień w którym Pan(i) jeden nowy pierścień powinien(a) wprowadzić lub jeden nowy plaster powinien(a) wprowadzić muszą plastry.

Przejdzie z jednej minipigułki

Możesz przejść z jednej na inną dzień przejść na Microgynon 30, ale musisz pierwszy dzień 7 dni tak jeden dodatkowy środek antykoncepcyjny (na przykład jeden prezerwatywa) używać.

Przejdzie z zastrzyku antykoncepcyjnego lub implantu Rozpocznij od Rozpocznij od Microgynon 30 kiedy Pan(i) inaczej następny zastrzyk otrzymał(a) lub w dzień w którym implant jest usunięty. Pan(i) musi usunięty. U musi de pierwsze 7 dni jednak tak jeden dodatkowy środek antykoncepcyjny (na przykład jeden prezerwatywa) używać.

Po porodzie Jeśli właśnie

urodziłaś poród jesteś, będzie twój lekarz ci prawdopodobnie zalecić aby czekać aż twoja pierwsza spontaniczna menstruacja, ale czasami jest to możliwe wcześniej aby zacząć. Śledź ten poradę swojego lekarza. To dotyczy także przypadku gdy jesteś karmiącą i chcesz karmić piersią oraz przyjmować pigułkę. używać.

Po poronieniu lub aborcji Postępuj

zgodnie z zaleceniem lekarza. Czy użyłeś za

dużo tego leku ? z to środek używa?

Nie istnieją żadne zgłoszenia o poważnych szkodliwych skutkach przy przyjmowaniu dużej ilości wiele Microgynon 30 tabletek naraz.

Jeśli kilka tabletki jednocześnie masz przyjęte, możesz mieć problem dostać z nudności, wymioty lub pochwowe krwawienie. Nawet dziewczęta które jeszcze nie miesiączkować mogą pochwowe krwawienie dostać jeśli one przez przypadek ten lek zażyły ..

użyć tego leku ? herbata używać?

Jeśli jesteś mniej niż 12 godzin za późno jesteś z przyjęciem tabletki, to działanie leku nie jest osłabione . Weź tę tabletkę mimo to jak najszybciej gdy tylko to możliwe . o tym myśli i weź następne tabletki ponownie o zwykłej porze przyjmij.

Jeśli więcej niż 12 godzin za późno jesteś z przyjęciem z jeden tabletką, może działanie działanie pigułki pigułki zmniejszone być. Im więcej tabletek z rzędu zapomniane jesteś, tym większe to większe staje się to szansa że de działanie pigułki zmniejszone jest. Szansa na niewystarczającą ochronę przed ciążą jest największa gdy tabletki są pomijane są pominięty na początku lub na końcu paska opakowania. Dlatego obowiązują następujące zasady (patrzrównież schemat): Więcej niż 1 tabletką

zapomniana w tym opakowaniu Skontaktuj się z

Skontaktuj się z twój lekarz.

1 tabletką zapomniana w tygodniu 1

Weź zapomnianą tabletkę gdy tylko ty o tym pomyślisz, nawet jeśli to by oznaczało że musisz dwie tabletki na tym samym momencie musisz przyjąć.

Weź dalej tabletki ponownie o zwykłej porze , ale musisz również przez 7 7 dni

extra środki antykoncepcyjne używać. Jeśli w tygodniu przed tabletką zapomnianą tabletką seks miałeś mieć możesz być w ciąży być. Skontaktuj się w tym przypadku dlatego natychmiast skontaktuj się z twoim lekarzem.

1 tabletką zapomniana w tygodniu 2

Weź zapomnianą tabletkę gdy tylko ty o tym pomyślisz, nawet jeśli to by oznaczało że u dwa tabletki o tym samym momencie musisz przyjąć. Weź następnie te tabletki ponownie o zwykłej porze . Działanie działanie pigułki jest jest nie zmniejszony, pani nie musi żadnych dodatkowych środków antykoncepcyjnych stosować ..

zapomniana w tygodniu 3 Możesz

wybrać spośród dwóch możliwości : możliwości:

1. Weź zapomnianą tabletkę gdy tylko sobie przypomnisz ,nawet jeśli to oznaczałoby że musisz wziąć dwie tabletki w tym samym momencie musisz moment musi przyjmować. Weź dalej tabletki tabletki ponownie o zwykłej godzinie . Pomijaj ponadto okres bez tabletek . i kontynuuj od razu z następnym . strip.

Najprawdopodobniej otrzymasz dopiero na końcu drugiego paska drugiego paska prawdziwe krwawienie z odstawienia , alemożesz podczas drugiego paska drugi paska także ostatni otrzymać plamienia lub jeden krwawienie przełomowe.

2. Ty możesz również przestać z odpowiednim paskiem i po okresie bez tabletek 7 dni dni (tel wel zawsze de dzień z w którym zapomniłeś wziąć tabletkę)kontynuować z następnym paskiem. Jeśli w swoim stałym dniu rozpoczęcia z dzień rozpoczęcia z jeden nowy pasek chcesz rozpocząć, możesz jeden beztabletowy okres krótszy niż 7 dni utrzymać.

Jeśli w jeden pasek tabletki zapomniłeś zapomnieć i ty otrzymuje żadnego krwawienia w najbliższym normalnym okresie bez tabletek może to oznaczać że jesteś w ciąży .

Powinieneś skontaktować się z swoim lekarzem lub farmaceutą lekarz zanim pan kontynuuje z następnym paskiem. Co pan

musi zrobić w przypadku wymiotów lub ciężkiej biegunki Jeśli pan w ciąży

Jeśli masz wewnątrz 3-4 godziny po zażyciu tabletki jeśli masz tabletkę musisz wymiotować, lub ciężką biegunkę dostaniesz, istnieje szansa że substancja czynna leku substancje nie całkowicie w ciało są wchłaniane. Ta sytuacja jest porównywalna z zapomnieniem o tabletkach. Po wymiotach lub biegunkach musisz jak najszybciej szybko możliwie nową tabletkę z rezerwowego paska przyjąć .. możliwe w ciągu 12-12 godzin po na to pora kiedy Pan(i) zwykle swoją tabletkę przyjmuje. Jeśli to nie możliwe jest, lub jeśli 12 godzin już minęło ,należy musi u lekarza poradę przestrzegać jak powyżej wskazano przy 'Czy zapomniałaś użyć tego leku ? '.
Opóźnienie miesiączki

: co musisz wiedzieć o miesiączce: co ty musisz wiedzieć

Umożesz swoją menstruację opóźnić przez bez przerwy kontynuować aby przejść do nowego blistera Microgynon 30. Możesz kontynuować z nowym z ten pasek kontynuować aż wszystkie tabletki zużyte są lub opcjonalnie wcześniej przerwać. Możesz można podczas używania stosowania tego drugiego paska dobrze ostatni mieć z krwawieniem przełomowe lub plamienie. Po zwykły beztabletowy okres 7 dni zaczynasz wtedy ponownie z następnym paskiem.

Dzień rozpoczęcia z twojej miesiączki zmieniać: co musisz wiedzieć Jeśli

twoje tabletki zgodnie z instrukcjami przyjmujesz , to będzie twoja miesiączka zawsze około około nadal na około ten sam dzień rozpocząć. Jeśli ten dzień chcesz zmienić, to możesz to zrobić poprzez normalny okres bez tabletek pomiędzy dwoma paskami a dwoma paskami a skrócić (ale nigdy przez przedłużyć).Na przykład jeśli twoja menstruacja zwykle w piątek zaczyna się i chcesz aby w przyszłości przesunąć na kontynuację przesunięcie do wtorek (3 dni wcześniej) niż musisz teraz 3 dni wcześniej niż zwykle z nowym paskiem zacząć . Jeśli okres bez tabletek jest bardzo krótki krótki robi (na przykład 3 dni lub mniej) może się zdarzyć że w trakcie tego okresu bez tabletek nie krwawienie będziesz mieć .Ty możesz wtedy podczas następnego opakowania mieć problem z krwawieniem przełomowym lub plamieniem.

Jeśli przestaniesz stosować ten lek to możesz

zmożesz z Microgynon 30 przestać kiedy tylko chcesz. Jeśli nie chcesz zajść w ciążę, zapytaj wtedy swojego lekarza o poradę w odniesieniu do innych wiarygodnych metody z antykoncepcji.

Jeśli przestajesz ponieważ chcesz zajść w ciążę chcesz są, zaleca się ogólnie ogólny poczekać aż czekać aż u jeden naturalny menstruacja miała zanim u próbuje w ciąży zajść . Umożna wtedy łatwiej obliczyć kiedy kiedy de poród będzie mieć miejsce.

Czy Pan/Pani jeszcze inne pytania dotyczące stosowania tego leku ? Proszę skontaktować się z swoim lekarzem lub farmaceutą ..

4. Możliwe działania niepożądane

Tak jak każde lekarstwo może ten lek działania niepożądane mieć, choć nie każdy ich doświadcza . Jeśli. działania niepożądane jeden działanie niepożądane, zwłaszcza jeśli to poważne o charakterze jest i długo utrzymuje się, lub występuje zmiana jeden zmiana w

twoim stan zdrowia którego u myślisz że to spowodowane może być przez Microgynon 30? Skontaktuj się z swoim lekarzem.

Wszystkie kobiety które złożone hormonalne środki antykoncepcyjne używać, mieć jeden wyższe ryzyko na zakrzepy krwi w żyłach (żylna zakrzepica z zatorami [VTE]) lub zakrzepy krwi w tętnicach (tętnicza zakrzepica z zatorami [ATE]). Zobacz dla więcej informacji o różnych ryzykach stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych sekcja 2 'Kiedy należy zachować ostrożność są z ten lek?'.

Poważne działania niepożądane

Poważne działania niepożądane które są związane z stosowaniem tabletki w kontekście są przypisane zostają opisane w 'wZakrzepy krwi (zakrzepica)' i 'Microgynon 30 i rak'. Przeczytaj te paragrafy dla więcej informacji i skonsultuj się natychmiast z lekarz jeśli potrzebne.

Skontaktuj się bezpośrednio z twoim lekarzem jeśli masz objawy obrzękunaczynioruchowego dostaniesz takie jak opuchnięta twarz , języki / lub gardło/gardło enof problemy z przełykaniem lub pokrzywka możliwe razem z problemami z oddychaniem (patrz również sekcja 2: 'Kiedy należy u dodatkowo ostrożny być z tym lekiem?').

Inne możliwe działania niepożądane

Następujące działania niepożądane są wymieniane przez użytkowniczkę pigułek użytkowniczki pigułek. działania niepożądane działania niepożądane mogą zwłaszcza w pierwszych kilku miesiącach stosowania pigułki występować. Często ustępują same po pewnym czasie samoistnie .

Często występujące działania niepożądane (występują u od 1 do 10 na 100 użytkowniczek):

- depresyjny nastrój, zmiana nastroju
- ból głowy
- nudności, ból brzucha
- ból w piersiach, wrażliwe piersi
- przyrost masy ciała.

Czasami występujące działania niepożądane (występują u 1 10 na 1.000 użytkowniczek użytkowniczki zmniejszone

- libido (ochota na seks))
- migrena
- wymioty, biegunka
- wysypka, wysypka z silnym świądem i tworzenie się guzków
- powiększenie się piersi zatrzymywanie
- płynów z płyn.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1 10 na 10.000 użytkowniczek użytkowniczki nadwrażliwość

- zwiększone
- libido (ochota na seks)podrażnienie
- podrażnienie z oczu przy stosowaniu soczewek kontaktowych
- postać wysypki skórnej z bolesnymi niebiesko-czerwonymi guzkami, postać wysypki skórnej gdzie występuje również mowa może być z guzki, pęcherzyki lub obrzęk
- pochwy wydzielina, wydzielina z brodawki utrata masy ciała
- szkodliwe

- zakrzepy krwi zakrzepy krwi w jeden żyła lub tętnica, na przykład:
 - o w jednej nodze lub stopie (tzn.. głęboka zakrzepica żylna)
 - o w jednej long (t.j.. zatorowość płucna)
 - o zawał serca
 - o udar
 - o 'mini-udar' lub tymczasowe objawy takie jak przy udarze ,znane jako TIA (przemijającyniedokrwieny atak atak)
 - o zakrzepy krwi w wątrobie, żóładekjelita, nerki lub oczy.

Ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi jest większe jeśli jest większy jeśli są inne okoliczności dotyczące ciebie mające zastosowanie są które to ryzyko zwiększa (patrz sekcja 2 dla więcej informacji na temat okoliczności które ryzyko na zakrzepy krwi zwiększają i objawy zakrzepów krwi jednego zakrzepu).

Następujące poważne działania niepożądane są nieco częstsze częściej zgłoszono u kobiet które stosowały pigułkę antykoncepcyjną , ale nie jest wiadomo czy to zostało spowodowane przez leczenie (patrz punkt2: ' rubryka 2: 'Kiedy musisz być dodatkowo ostrożny z tym lekiem ?').podwyższone

- ciśnienie krwi guzy wątroby
- lub rak piersi Następujące

choroby są również wskazane także w opatrunek przyniesiony z tabletki złożone:

Choroba Crohna , wrzodziejące zapalenie jelita grubego, porfirie (choroba metaboliczna powodująca ból brzucha i zaburzenia psychiczne),, systemowy toczeń rumieniowaty (gdzie ciało atakuje własne narządy i tkanki i uszkadza), opryszczka końca ciała koniec z de ciąża, płasawica Sydenhama (szybkie mimowolne drgające lub szarpiące ruchy), hemolityczny mocznicowy zespół (choroba która występuje po biegunce która umrzeć powoduje jest przez E.coli), problemy z wątrobą które widoczne stają się przez żółtaczkę.

Zgłaszanie działania niepożądane działań niepożądanych działania niepożądane
Czy masz objawy działania niepożądane, skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą. Dł dotyczy również dla możliwych działań niepożądanych które nie w tej ulotce są. Możesz zgłaszać działania niepożądane również bezpośrednio zgłosić przez Holenderski Działania niepożądane Centrum Lareb, strona internetowa www.lareb.nl. Przez działania niepożądane zgłaszać można, możesz nam pomóc uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku . to lekarstwo.

5. Jak przechowywać Pan/Pani ten lek?

Przechowywać poniżej 30°C.

Poza zasięgiem i dostępem dzieci trzymać ..

ten to lek nie więcej po de ostateczna data ważności. Jest to do znalezienia na opakowaniu i pasku po 'EXP'. Tam znajduje się miesiąc i rok jeden rok. Ostatni dzień tego miesiąca to ostateczna data ważności data ważności.

leków leki zlewie ani w toalecie i wyrzucić w wrzód ze nie w koszu na śmieci.

Zapytaj swojego farmaceutę co zrobić z lekami należy zrobić które już nie używasz. Są przetwarzane następnie w jednym odpowiedzialny sposób zniszczony i nie trafić do środowiska dostać się.

6. Zawartość opakowania opakowania i pozostałe informacje

Jakie substancje są w ten środek?

Ten substancje czynne w tym środku są levonorgestrel levonorgestrel etynyloestradiol . Każda tabletkiMicrogynon 30 30 0,030 miligrama etynyloestradiolu etynyloestradiol w 0,150 milligram lewonorgestrelu.

De inne substancje w tym leku to laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, povidon 25 (E1201), stearynian magnezu (E470B), sacharoza, povidon 700.000, polietylenoglikol 6.000, węglan wapnia (E170), talk (E553b), воск montanowy glikolowy (E192), dwutlenek tytanu (E171), glicerol 85% (E442) i pigment tlenku żelaza (żółty, E172).

Jak wygląda Microgynon 30 i ile ile znajduje się w jedno opakowanie?

Tabletki Microgynon-30 są powlekane tabletki; rdzeń tabletki jest powleczony warstwą jedną powłoką. Tabletki są żółte ..

opakowanie opakowanie Microgynon 30 zawiera 3 paski, każdy z 21 tabletek.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla w obrocie wprowadzenia i producent

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla w handel przynosić

Bayer B.V.
Siriusdreef 36
2132 WT Hoofddorp

Producent
Bayer AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin, Niemcy

Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Doebereinerstrasse 20
99427 Weimar, Niemcy

Dla informacji:
Bayer B.V., Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp,

W rejestrze zarejestrowany pod RVG 08204

Ta ulotka jest dla tej ostatnio zatwierdzona w lipcu 2025.