

Prospect: informații pentru utilizatoare Microgynon

30, 0,15 mg/0,03 mg comprimate filmate levonorgestrel /

etinilestradiol Citiți

cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament merge utilizați, deoarece există scris importantă informație în pentru dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. Poate aveți nevoie de el mai târziu din nou nevoie.

Aveți u încă întrebări? Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul.

Nu dați acest medicament nu mai departe altora , deoarece estedoar pentru dumneavoastră prescris prescris. Het poate dăunător fi pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră. Aveți

Primește un dintre efectele adverse care sunt în rubrică 4 sunt menționate? Sau aveți dumneavoastră un efect secundar care nu este în acest prospect menționat?

Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Importante lucruri pe care trebuie să le știți despre contraceptivele combinate hormonale anticoncepționale:

medicamente reprezintă una dintre cele mai fiabile metode reversibile de contracepție, cu condiția corect utilizat

Ele dau un ceva mai mare risc de apariția unui cheag de sânge cheag de sânge tromboză) învene și artere artere, mai ales în primul an când utilizați un combinat hormonal contraceptiv utilizați sau dacă utilizați după o întrerupere de 4 săptămâni de mai lung din nou începe cu utilizarea unui un combinat hormonal contraceptiv
Atenție bine la și contactați dumneavoastră medicul dacă dumneavoastră crede că dumneavoastră posibil simptome de un cheag de sânge aveți (vezi secțiunea 2 'Cheaguri de sânge (tromboză)').

În acest prospect:

1. Ce este Microgynon 30 și pentru ce se acest medicament utilizat?
2. Când nu trebuie să acest medicament nu utilizați sau trebuie să fiți atent atenție cu fiți?
3. Cum utilizați dumneavoastră acest medicament?
4. Posibile efecte secundare
5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?
6. Conținutul de la ambalaj și alte informații

1. Ce este Microgynon 30 și pentru ce se utilizează acest medicament?

Microgynon 30 este o pilulă contraceptivă. Microgynon 30 este utilizat pentru a preveni sarcina a preveni.

Pilule contraceptive care conțin două hormoni sunt numite 'pilule combinate' numite. Cele două diferite feminini hormoni sunt levonorgestrel (un hormon cu efect asemănător progesteronului)și etinilestradiol etinilestradiol unhormon cu efect estrogenic). Pilule contraceptive). Pastile contraceptive cu două hormoni sunt foarte fiabile. Dacă ele corect sunt administrate (fără ca comprimatele să fie uitate) este șansa de sarcină foarte mic.

2. Când nu aveți voie să acest medicament nu utilizați sau trebuie să fiți extra precaut cu fiți?

Observații Citiți

Notă înainte de dumneavoastră începeți cu utilizarea a Microgynon 30 citiți informațiile despre cheaguri de sânge (tromboză) în rubrica 2. Este în special important ca dumneavoastră citește ce simptomele sunt ale unui cheag de sânge – vezi rubrica 2 'Cheaguri de sânge (tromboză)'.

Înainte să puteți începe cu utilizarea a Microgynon 30, va dumneavoastră medicul vă va un număr de întrebări despre dumneavoastră istoricul personal de boli și cel al dumneavoastră familiei apropiate și rudele apropiate. Medicul va de asemenea vă tensiunea arterială măsura și, în funcție de situația dumneavoastră personală ,posibil de asemenea alte încă investigații efectua a face.

În acest prospect sunt descrise diferite situații în care trebuie să opriți utilizarea produsului Microgynon 30 sau în care fiabilitatea este compromisă de Microgynon 30 redus poate fi. În acele situații trebuie să fie nu aveți sex, fie un contraceptiv suplimentar fără hormoni utilizați, cum ar fi de exemplu un prezervativ sau o altă metodă de barieră. Nu folosiți metoda de temperatură sau abținerea periodică. Aceste metode pot fi nesigure pentru că Microgynon 30 modificările lunare ale temperaturii corpului și mucoasei cervicale influențează mucoasa colului uterin La fel.

alte medicamente altă anticoncepționale cu hormoni protejează Microgynon 30 nu împotriva infecției cu hiv-virusul (SIDA) sau alte boli transmisibile sexual (BTS).

Când aveți voie acest medicament nu utilizați?

Aveți voie acest medicament nu utilizați dacă aveți una dintre mai jos menționate afecțiuni aveți. Dacă aveți un sau mai multe dintre următoarele afecțiuni are ,spuneți acest lucru atunci la medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va discuta cu dumneavoastră despre care alt formă de contracepție mai potrivită este pentru dumneavoastră.

Utilizați Microgynon 30 nu:

dacă aveți un cheag de sânge în un vas de sânge al picioarelor (profundă venoasă tromboză, TVP), plămâni (embolie pulmonară, EP) sau alt organ are, sau acest lucru în trecut a avut ați avut dacă dumneavoastră știți că dumneavoastră aveți o tulburare care vă afectează coagularea sângelui – de exemplu deficiență de proteina C Deficiență de Cdeficiență de proteina S -deficiență, antitrombină III-deficiență, factor V-Leiden sau anticorpi împotriva fosfolipidelor
dacă dumneavoastră trebuie să fiți operat sau veți fi sau pe o perioadă lungă de timp nu sunteți mobil (vezi rubrică 'Cheaguri de sânge (tromboză)')
dacă ați avut un atac de cord sau accident vascular cerebral ați avut dacă aveți angină pectorală (angină pectorală (afecțiune afecțiune care severă durere în piept cauzează și un prim simptom al unui infarct poate fi) sau un atac ischemic tranzitoriu are (TIA – tranzitorii simptome de un accident vascular cerebral), sau acest lucru a avut dacă ați

un dintre următoarele boli aveți , care poate, care îl risc de un cheag de sânge în dumneavoastră artere pot crește:

- o diabet zaharat (boala zahărului) cu deteriorare a vaselor de sânge
- o hipertensiune arterială severă
- o un grav crescut nivel de grăsime în sângele dumneavoastră (colesterol sau trigliceride)
- o o afecțiune care se numește hiperhomocisteinemie este numită

dacă aveți un tip de migrenă că 'migrenă cu aură' este numită are (sau a avut)dacă dumneavoastră o afecțiune hepatică severă sau icter aveți , sau în trecuți avut trecut are avut

dacă dumneavoastră un tumoră în ficatul dumneavoastră aveți, sau aveți avut

dacă dumneavoastră cancer de sân sau cancer la organele genitale are, sau în trecut are avut

dacă dumneavoastră sângerări neobișnuite din vagin aveți, a căror cauză nu a fost stabilită dacă

ca u alergic sunteți la una dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe puteți găsi în secțiunea 6. 6.

Utilizare Microgynon 30 nu dacă aveți hepatită C aveți și pentru aceasta medicamente cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir sau sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir utilizat (vezi de asemenea rubrica 2 'Utilizați dumneavoastră alte medicamente ?').Când

trebuie să fiți precaut fiți cu acest lucru medicament?

Când trebuie să contactați medicul dumneavoastră cu medicul?

Solicitați ajutor medical de urgență dacă

- aveți posibile simptome sau plângeri sau de un cheag de sânge observați, care pot însemna că suferiți de un cheag de sânge în piciorul dumneavoastră (adică .venă. venoasă venoasă tromboză), un cheag de sânge în plămânul dumneavoastră (adică..),un infarct sau un accident vascular cerebral (vezimai jos de de rubrică 'Cheaguri de sânge (tromboză)').

Mergi pentru o descriere a simptomelor sau semnelor acestor grave reacții adverse la 'Cum Cum recunoaște dumneavoastră un cheag de sânge?'.

Spuneți acest lucru medicului dumneavoastră, dacă unul dintre următoarele situații se aplică în cazul dumneavoastră este. Contactați

medicul dumneavoastră sau farmacist înainte dumneavoastră acest medicament utilizați. În unele situații trebuie să fiți precaut fiți dacă dumneavoastră Microgynon 30 sau un alt contraceptiv combinat utilizat. poate necesar să fie că dumneavoastră regulat de medicul dumneavoastră fiți monitorizat. Dacă afecțiunea apare, sau se agravează, în timp ce u Microgynon 30 utilizați, trebuie să acest lucru de asemenea la medicul dumneavoastră spuneți.

Dacă fumați.

Dacă aveți diabet (diabet zaharat) are.

Dacă aveți mult prea greu sunteți.

Dacă aveți o tensiune arterială mare.

Dacă aveți o afecțiune a valvelor cardiace sau o anumite aritmie cardiacă are.

Dacă cineva în familia dumneavoastră apropiată a avut vreodată tromboză, un infarct sau un accident vascular cerebral a avut gehad.

Dacă suferiți de migrenă.

Dacă aveți epilepsie are (vezi 'Utilizați dumneavoastră alte medicamente ?'). Dacă cineva din familia dumneavoastră directe familie vreodată cancer de sân a avut a avut.

Dacă aveți o afecțiune a ficatului sau a vezicii biliare aveți.

Dacă aveți boala Crohn sau colită ulcerosă (cronică inflamator boală intestinală) aveți

Dacă aveți sistemică lupus eritematos sistemic (LES – o boală care sistemul dumneavoastră natural imunitar afectează) aveți.

Dacă aveți hemolitic-uremic sindrom (HUS – un tulburare a coagulării sângelui care insuficiență renală provoacă) are.

Dacă aveți anemie falciformă (o ereditară boală a globulelor roșii sanguine) are.

Dacă aveți niveluri crescute de grăsimi în sângele dumneavoastră (hipertrigliceridemie) aveți, sau această afecțiune apare în familia dumneavoastră frecvent de este în dumneavoastră familie apărut. Hipertrigliceridemia este în legătură adus cu un mai mare risc de pancreatită (o inflamație a pancreasului) să a primi.

Dacă dumneavoastră operat trebuie să fiți sau sunteți pe o durată lungă de timp nu pe picioare (vezi 'Cheaguri de sânge' în secțiunea 2).

Dacă dumneavoastră recent naștere sunteți, aveți dumneavoastră un risc crescut de a dezvolta formarea de cheaguri de sânge. Întrebați medicul dumneavoastră cum curând după naștere puteți tu puteți începe cu utilizarea a Microgynon 30.

Dacă aveți o inflamație în vene imediat sub piele (tromboflebităsuperficială tromboflebită) are

Dacă aveți varice are.

Dacă aveți cloasmă are sau ați are vreodată cloasmă avut (pete pigmentare galben-maronii pete pigmentareașa-numitele ' pete de sarcină',', mai ales în față); dacă acesta este cazul , este înțelept să evitați expunerea la lumina soarelui sau la lumină ultravioletă te evita.

Dacă aveți simptome de angio-edem apare, cum ar fi un față umflată , limbăși /sau gâtși /sauprobleme cu înghițirea sau urticarie furuncule posibil împreună cu probleme cu respirația, contactați imediat medicul dumneavoastră. Produse care conțin hormoni estrogeni ,pot posibil să agraveze simptomele de ereditar și dobândit angio-edem cauza sau agrava.

CHEAGURI DE SÂNGE (TROMBOZĂ)

Dacă utilizați un combinat hormonal contraceptiv precum Microgynon 30 utilizați, are dumneavoastră un risc mai mare de cheaguri de sânge a obține decât dacă dumneavoastră nu un hormonal combinat contraceptivutilizați . În rareori cazuri poate un cheag de sânge un vas de sânge bloca și probleme grave cauza.

Cheagurile de sânge pot apărea

în vene (acest se numește 'venoasă tromboză', 'venoasă trombo-embolie' de VTE numită),

în artere (aceasta este 'arterială tromboză', 'arterială trombo-embolie' de ATE numit).

Bărbați recuperează nu întotdeauna complet de cheaguri de sânge. În rare cazuri pot exista efecte grave de lungă durată serioase fi, sau în foarte rar cazuri pot cheaguri de sânge letal fi ..

important că dumneavoastră știți că riscul general de este pe un dăunător cheag de sânge prin Microgynon 30 mic este.

CUM RECUNOAȘTEȚI UN CHEAG DE SÂNGE?

Solicitați de urgență asistență medicală dacă aveți unul dintre următoarele simptome de simptome observat.

Aveți dumneavoastră unul dintre aceste plângeri sau simptome?
dumneavoastră suferi ?umflare

Unde puteți

umflare de un picior sau de-a lungul unei venă în
profundă
un picior sau picior, mai ales dacă acest este însoțit de
cu:

Tromboză venoasă

durere sau sensibilitate a piciorului, care
vă posibil doar simțiți la statul în picioare sau
mersul
temperatură crescută în
piciorul afectat
schimbare de culoare de la piele de la
picior, de exemplu palid, roșu sau
albastru devin

bruscă neexplicată dificultăți de respirație
sau rapidă respirație
brusc tuse fără clar
cauză, în care dumneavoastră sânge puteți expectorare
ascuțită durere în piept, care mai gravă poate
deveni dacă dumneavoastră adânc respirați
grav ușoară senzație în cap sau
amețeală
rapid sau neregulat ritm cardiac
durere severă în stomac dumneavoastră.

Embolie pulmonară

Dacă aveți îndoieli, contactați un medic, deoarece
unele de aceste simptome, cum ar fi tusea sau
dificultăți de respirație, pot în mod eronat fi
considerate ca o afecțiune mai ușoară, cum ar fi o
infecție respiratorie (de ex.. răceală).

Simptomele apar de obicei în un ochi :

Tromboză venoasă la

imediat pierderea a văzului, retină (cheag de sânge în
sau ochi)
fără durere vedere încețoșată , carese poate dezvolta în
pierderea pierdere al vedere

durere, disconfort, presiune sau greu senzație pe
piept
strâns sau plin senzație în piept, braț sau inferior
sternul stern

Infarct

plin senzație, indigestie sau lipsă de respirație gâfâit
disconfort în partea superioară a corpului care iradiază către
spate, maxilar, gât, braț și stomac
transpirație, greață, vărsături sau
amețeală
extremă slăbiciune, anxietate sau respirație scurtă
rapid sau neregulat ritm cardiac

bruscă slăbiciune sau amorțit senzație de
față, braț sau picior, în special pe o parte
a corpului
bruscă confuzie, dificultate în vorbire
sau înțelegere
bruscă dificultate cu vederea în unul sau ambii ochi
dificultate bruscă cu mersul, amețeală,
pierderea echilibrului sau coordonării coordonare
bruscă, severă sau de lungă durată durere de cap
fără cauză cunoscută
conștiență scăzută sau leșin cu sau
fără criză epileptică.

Accident vascular cerebral

Simptomele sunt de un accident vascular cerebral pot uneori doar scurt dura și aproape
imediat și complet recupera. Totuși trebuie să totuși de urgență medicală ajutor a solicita,
deoarece dumneavoastră un risc puteți avea de a încă un accident vascular cerebral a suferi ..

și ușoară decolorare albastră cianoză de un braț sau picior
severe durere în dumneavoastră abdomen (abdomen acut abdomen)

Cheaguri de sânge care alte
vase de sânge blochează

CHEAGURI DE SÂNGE ÎNTR-O VENĂ

Ce poate er se întâmplă dacă er un cheag de sânge este format în o venă?

Utilizarea de contraceptive hormonale combinate este în legătură bandaj adus cu un
risc crescut de cheaguri de sânge în un vas de sânge (tromboză venoasă).Aceste
efecte secundare apar însă rar la pacienți. De obicei apar în primul an în care un
combinat hormonal contraceptiv este utilizat.

Dacă un cheag de sânge se formează în un ader în un picior sau picior, poate cauza un
tromb venos profund (TVP) provoca.

Dacă un cheag de sânge din picior este transportat și în plămân ajunge, poate să
provoace o embolie pulmonară cauza.

întâmplă foarte rar ca un cheag de sânge să provoace este format în o venă în un alt
organ, cum ar fi ochiul (trombozăvenoasă în retină).Când

Când este riscul de un cheag de sânge într-o venă cel mai mare ?Riscul

de un cheag de sânge într-o venă este cel mai mare este cel mai mare în primul an când o
femeie pentru prima dată utilizează un contraceptiv hormonal combinat. Riscul poate fi de
asemenea crescut sunt dacă dumneavoastră după un întrerupere de 4 săptămâni sau mai mult
din nou începeți cu utilizarea unui unui combinat hormonal contraceptiv (același produs, sau
un alt produs decât înainte).

După primul an devine riscul mai mic , darel rămâne puțin mai mare decât și dacă dumneavoastră nu combinat hormonal contraceptiv utilizați.

Dacă dumneavoastră opriți utilizarea Microgynon 30, riscul dumneavoastră de un cheag de sânge în câteva zile săptămâni din nou normal.

Cum mare este riscul de un cheag de sânge?

Riscul depinde de de dumneavoastră natural risc pe TEV, și de tipul combinat hormonal contraceptiv pe care îl utilizați.

Riscul general de un cheag de sânge în un picior sau plămân (trombozăvenoasă profundă venoasă tromboză sau embolie pulmonară) cu Microgynon 30 este mic.

- Din fiecare 10.000 femei care nu niciun combinat hormonal contraceptiv utilizează en nu însărcinată fi, obțin acolo aproximativ 2 în o perioadă de un an un cheag de sânge.
- Din fiecare 10.000 femei care utilizează combinat hormonal contraceptiv folosesc care conține levonorgestrel conține precum Microgynon 30, primesc aproximativ aproximativ 5-7 în o perioadă de un an un cheag de sânge.
- Riscul de a obține un cheag de sânge este dependent de istoricul dumneavoastră medical personal antecedente medicale (vezi rubrici 'Factori care vă riscul de un cheag de sânge într-o venă arterăcresc 'mai jos)Riscul de a

în un an un
cheag de sânge a obține

Femei care nu combinat hormonal pastilă utilizează și nu sunt însărcinate sunt	Aproximativ 2 din fiecare 10.000 femei
---	---

Femei care un pilulă combinată utilizează care levonorgestrel conține	Aproximativ 5-7 din fiecare 10.000 femei
--	---

Femei care Microgynon 30 utilizează	Aproximativ 5-7 din fiecare 10.000 femei
-------------------------------------	---

Factori care vostru risc de un cheag de sânge într- un vas cresc

Riscul de un un cheag de sânge cu Microgynon 30 este mic, dar există sunt anumite circumstanțe care riscul cresc. Riscul dumneavoastră este mai mare ::

dumneavoastră u grav obezitate are (IMC [indice de masă corporală] mai mare de 30 kg/m²)

dacă unul dintre dumneavoastră apropiați de tânăr vârstă (de exempluînainte de înainte de het 50^e an) un cheag de sânge a avut a avut în un picior, plămân sau alt organ. În acel caz puteți dumneavoastră un ereditar tulburare de coagulare aveți.

dacă dumneavoastră o operație trebuie să suportați, sau dacă dumneavoastră lung timp nu sunteți pe picioare din cauza unei leziuni sau boală, sau dacă dumneavoastră picior în gips este. Poate fi necesar să înainte de o operație , saucând sunteți mai puțin mobil , câteva câteva săptămâni să opriți utilizarea utilizarea a Microgynon 30. Dacă

trebuie să opriți utilizarea Microgynon 30, întrebați atunci medicul dumneavoastră când puteți din nou puteți începe cu utilizarea.
dacă sunteți mai în vârstă deveniți (în special aproximativ peste 35 ani)
dacă în ultimele săptămâni naștere sunteți.

Acest risc de un cheag de sânge crește pe măsură ce sunt mai multe dintre aceste circumstanțe se aplică în cazul dumneavoastră sunt.

O călătorie cu avionul (mai lung de 4 ore) poate crește riscul de un cheag de sânge temporar crește, mai ales dacă există încă câteva alte de menționate circumstanțe asupra dumneavoastră aplicabile sunt.

Este important ca dumneavoastră medic spuneți dacă un sau mai multe dintre acestea condiții pe dumneavoastră de aplicare sunt, chiar dacă dumneavoastră despre aceasta aveți îndoieli. Medicul dumneavoastră poate decide că dumneavoastră trebuie să opriți utilizarea medicamentului utilizarea a Microgynon 30.

Dacă una dintre mai sus menționate situații se schimbă în timp ce utilizați Microgynon 30 utilizați, de exemplu dacă un lângă membru de familie un cheag de sânge (tromboză) primește fără cauză cunoscută, sau dacă dumneavoastră mult în greutate câștigați, spuneți spune acest atunci la dumneavoastră medicului.

CHEAG DE SÂNGE ÎNTR-O ARTERĂ

Ce poate să se întâmple dacă se formează un cheag de sânge este format într-o arteră?

Net ca un cheag de sânge în o venă, poate un cheag de sânge în o arteră cauza probleme grave. Poate de exemplu provoca de exemplu un infarct sau un accident vascular cerebral provoca.

Factorii care vostru risc de un cheag de sânge în o arteră cresc

Este important că u știți că riscul de de un infarct sau accident vascular cerebral prin utilizarea de Microgynon 30 este foarte mic, dar mai mare poate fi:

- cu creșterea vârstei (peste aproximativ 35 ani)
- dacă fumați. Dacă utilizați un combinat hormonal contraceptiv precum Microgynon 30 utilizat, se recomandă să vă opriți fumatul. Dacă nu puteți opri fumatul și sunteți mai în vârstă de ani mai mare de 35 ani, poate medicul dumneavoastră să vă recomande să un alt tip de contraceptiv să utilizați
- dacă aveți supraponderalitate
- dacă aveți tu tensiune arterială are
- dacă un membru al familiei apropiate a tânără vârstă (înaintea de 50 de ani) un infarct miocardic infarct miocardic de accident vascular cerebral a avut loc. În acel caz puteți dumneavoastră de asemenea un risc crescut avea de un infarct sau accident vascular cerebral să te primi
- dacă dumneavoastră, sau un membru al familiei apropiate, un nivel crescut de grăsimi în sânge are (colesterol sau trigliceride trigliceride)
- dacă dumneavoastră u la migrenă suferiți, în special migrenă cu aură
- dacă dumneavoastră o afecțiune cardiacă aveți (afecțiune a valvelor cardiace, sau o aritmie cardiacă care fibrilație atrială este numită)

dacă dumneavoastră diabet (diabet) aveți.

Dacă mai decât una dintre aceste condiții se aplică dumneavoastră, sau dacă un dintre de la aceste afecțiuni deosebit grav este, poate riscul de a obține un cheag de sânge chiar mai departe crescut fi . Dacă.

Ca unul dintre mai sus menționate circumstanțe se schimbă în timp ce utilizați Microgynon 30 utilizați, de exemplu dacă începeți să fumați sau dacă ca un lângă membru al familiei un cheag de sânge (tromboză) primește fără cauză cunoscută , saudacă dumneavoastră mult în greutate câștigați ,, spuneți acest lucru atunci la medicul dumneavoastră.

Microgynon 30 și cancer

La femeile care folosesc pilula se observă ceva mai des cancer de sân diagnosticat constatat dan la neutilizatoare de pilule de aceeași vârstă. Zece ani după oprirea utilizării pilulei , nu mai există niciun diferență . Nu este cunoscutdacă nu se știe de acest diferență este cauzată de pilulă. poate de asemenea apărea deoarece utilizatoarele de pilule mai amănunțit și mai frecvent sunt examinate, astfel încât de cancer de sân mai devreme este descoperit. Cum mai devreme de cancerul este descoperit, cu atât mai bine rezultatele tratamentului . În.

cazuri zeldzame cazuri sunt la utilizatoarele de pilule tumori hepatice benigne găsite și în în încă mai rare cazuri tumori hepatice maligne . Uneoriau aceste tumori condus la până la un care pune viața în pericol internă sângerare. Dacă dumneavoastră brusc aveți probleme cu dureri abdominale, atunci trebuie să contactați imediat un medic dumneavoastră medic.

La femeile care au luat pilula pentru o perioadă lungă de timp au utilizat este ceva mai frecvent cancer de col uterindiagnosticat . Acest lucru nu trebuie prin pilula a veni dar poate a face au cu comportament sexual și alți factori. Este încă nu clar cum mare de influența acesteia este asupra obținerii de cancer de col uterin. Este bine clar că cea principală cauză a cancerului de col uterin o infecție de lungă durată cu așa-numitul uman papillomavirus (HPV) este.

Tulburări psihice

Unele femei care hormonale contraceptive inclusiv Microgynon 30 utilizează, au raportat despre de la depresie sau melancolie. Depresia poate fi gravă și poate uneori duce la gânduri de sinucidere . Dacă aveți schimbări de dispozițieși simptome de depresie de la depresie experimentați, contactați cât mai repede posibil medicul dumneavoastră dumneavoastră medic pentru informații medicale suplimentare.

Sângerare intermenstruală

Cu toate pastilele poate în primele câteva luni uneori neașteptat sângerare apărea (pătare sau sângerare de întrerupere). Dumneavoastră puteți atunci poate nu fără absorbant. Continuați în orice caz normal dumneavoastră comprimatele luați. Het sângerare neregulată se oprește de obicei când corpul dumneavoastră s-a obișnuit cu este cu pilula respectivă pilulă (na aproximativ 3 benzi). Dacă durează mai mult, se agravează sau reapare din nou , trebuiesă contactați medicul dumneavoastră . cu dumneavoastră medic.

Ce trebuie să faceți dacă nu aveți sângerare în timpul zilelor fără comprimate

Dacă ați luat toate comprimatele corect și nu ați avut probleme are avut de vărsături și de asemenea niciun alte medicamente ați utilizat, este foarte puțin probabil că sunteți însărcinată . Vă puteți atunci liniștit cu următoarea folie continuați.

Dacă așteptata sângerare totuși de două ori la rând nu apare puteți fi însărcinată . Luați legătură cu imediat contactați medicul dumneavoastră . Nu continuați cu următorul blister Microgynon 30 30 medicul dumneavoastră să fi stabilit că nu sunteți însărcinată u nu însărcinată ești.

Utilizare la copii

Microgynon 30 este nu destinat pentru femei care încă nu menstruează.

Utilizare la femei în vârstă

Microgynon 30 trebuie nu utilizat fi după de menopauză.

Utilizați dumneavoastră alte medicamente medicamenteUtilizați

dumneavoastră pe lângă Microgynon 30 30 încă alte medicamente, sau ați dumneavoastră asta recent ați făcut sau există posibilitatea ca dumneavoastră în viitorul apropiat alte medicamente altă medicamente merge utiliza? Spuneți asta atunci medicul dumneavoastră sau farmacistul. Ei pot să vă spună dacă este necesar să luați măsuri contraceptive suplimentare anticonceptive să luați (de exemplu prezervative) și, dacă că al caz este, cât timp trebuie să acest lucru să faceți.

Unele medicamente pot o influență avea pe nivelurile sanguine de Microgynon 30 și pot protecția împotriva sarcinii reduce , saupot sângerare neașteptată cauza . Acestse referă la aici om:

medicamente pentru de tratamentul al

- o epilepsiei (de exemplu primidon, fenitoină, barbiturice, carbamazepină, oxcarbazepină, topiramat sau felbamat)
- o tuberculoză (de exemplu rifampicină)
- o infecții cu HIV- și virusul hepatitei C (așa-numiți inhibitori de protează și non--nucleozidic precum ritonavir, nevirapină, efavirenz). infecții fungice
- o infecții fungice (griseofulvină)
- o artrită, artroză (etoricoxib)
- o ridicat tensiune arterială în vasele de sânge pulmonare (bosentan).

remediul pe bază de plante sunătoare sunătoare.

30 30 poate de acțiunea a altor medicamente influența, de exemplu

medicamente care conțin ciclosporină conțin

anti-epileptic lamotrigine (acest poate duce la o creștere număr atacuri)

teofilină (este utilizat în tratamentul problemelor respiratorii probleme

respiratoriitizanidină (

esteutilizat în tratamentul problemelor respiratorii) dureri musculare și/sau crampe musculare).

Utilizați Microgynon 30 nu dacă aveți hepatită C aveți și pentru aceasta medicamente cu ombitasvir/paritaprevir/ritovanir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir de sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir utilizat, deoarece aceste medicamente o creștere a enzimei hepatice ALAT-enzimă hepatică (un test de sânge pentru funcția hepatică) pot cauza. Medicul dumneavoastră va vă un alt contraceptiv prescrie înainte să începeți tratamentul cu acest medicament acest medicamente. Microgynon 30 poate aproximativ 2 săptămâni după

Încheierea a acestei tratament fi reluat. Vezi secțiunea 2 'Când aveți voie acest medicament nu utilizați?'.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți însărcinată , sau credeți că sunteți însărcinată ați putea fi , aveți voie, puteți Microgynon 30 nu utilizați.

Utilizarea Microgynon 30 nu este recomandată atâta timp cât o femeie alăptează atâta timp cât unul femeie alăptare dă. Dacă pilula totuși doriți să utilizați în timp ce sunteți încă alăptați ,puteți să cel mai bine contactați medicul dumneavoastră . abilitatea de a conduce

vehicule. en het utilizarea de mașini

Există nu nicio indicație că de abilitatea de a conduce este afectată.

Microgynon 30 conține zahăr și lactoză

Dacă dumneavoastră medicul v-a spus că nu tolerați anumite zaharuri , contactați mediculdumneavoastră înainte să luați acest medicament medicament ia.

3. Cum utilizați dumneavoastră acest medicament?

Utilizați acest medicament întotdeauna exact așa cum medicul dumneavoastră v-a spus . Aveți. dumneavoastră despre dumneavoastră despre corectă utilizare? Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul.

Când și cum luați dumneavoastră comprimatele ?

Banda conține 21 comprimate. În cazul fiecărei tablet stare indicat pe care zi cea trebuie fie administrată. Luați tabletele în fiecare zi aproximativ la aceeași oră , dacă este necesar cu puțină apă. Urmați direcția săgeții de pe blister indicată până când ați luat toate cele 21 de comprimate . Apoi. niciun comprimat timp de 7 zile . În această perioadă tablet. În decursul de timp 7 zile ar trebui un sângerare să înceapă (așa-numita sângerare de întrerupere).Aceasta începe de obicei în a 2^a sau a 3^a zi după na de ultima tabletă Microgynon 30. Începeți în a 8^a zi cu următoarea folie, indiferent dacă sângerarea este deja terminată sau nu. Acest lucru înseamnă că întotdeauna pe aceeași zi a săptămânii cu un următorul blister începe, și de asemenea că sângerarea de întrerupere fiecare lună aproximativ pe aceleași zile zile cade.

Dacă utilizați Microgynon 30 în acest mod utilizați, sunteți de asemenea în timpul celor 7 zile când nu luați comprimat sunteți protejat împotriva împotriva sarcină.

Când să începeți cu prima folie?

Ați luat în ultima lună niciun contraceptiv utilizat

Începeți cu Microgynon 30 în prima zi a ciclului (prima zi a menstruației). Luați uncomprimat la indicația corespunzătoare de pe blister. Puteți de asemenea în ziua de asemenea pe zi 2-5 din ciclu începeți dar atunci trebuie să primele 7 zile să un extra contraceptiv (de exemplu un prezervativ) utilizați.

Trecerea de la o altă pilulă combinată, inel vaginal contraceptiv sau platură contraceptiv Puteți începe cu Microgynon 30 în ziua după ce ați ultimul comprimat de dumneavoastră anterior pastilă ați luat (deci fără pauză). Dacă există la dumneavoastră anterior pastilă de asemenea comprimate neactive în folie în blister a sta, trebuie să imediat continuați după ultima activă tabletă de din dumneavoastră anterior pastilă (dacă nu știți care care că este, întrebați atunci pe dumneavoastră medic sau farmacist). Puteți de asemenea mai târziu începeți, dar niciodată mai târziu de ziua după sfârșitul perioadei fără tablete de de la dumneavoastră anterior pastilă (sau după ultima inactivă tabletă de dumneavoastră anterior pastilă). Dacă aveți un inel contraceptiv vaginal sau un platură contraceptiv utilizat, trebuie să de preferință începeți cu utilizarea de Microgynon 30 în ziua îndepărtării a ultimei inel sau platură de pe piele de un ambalaj ciclic, dar nu mai târziu de ziua în care dumneavoastră un nou inel ar trebui să introduceți sau un nou platură ar trebui platură.

Trecerea de la o minipilulă

Puteți trece de la una la alta zi treceți la Microgynon 30, dar trebuie să trebuie să prima 7 zile da un extra contraceptiv (de exemplu un prezervativ) utilizați.

Trecerea de la injecția contraceptivă sau un implant

Începeți cu Microgynon 30 când dumneavoastră altfel următoarea injecție ar primi sau în ziua în care implantul este îndepărtat . Trebuie să eliminat. U trebuie de primul 7 zile totuși da un extra contraceptiv (de exemplu un prezervativ) utilizați.

După o naștere

Dacă tocmai ați născut sunteți, va dumneavoastră medicul probabil recomanda să așteptați până prima dumneavoastră menstruație spontană, dar uneori este posibil să începeți mai devreme. Urmați sfatul medicului dumneavoastră. Acest lucru se aplică și în cazul în care alăptați și doriți să luați pilula . în de pastilă doriți utilizați.

După un avort spontan sau avort

Urmați sfatul medicului dumneavoastră. Ați utilizat

prea mult din acest medicament ? medicament utilizat?

Există nu rapoarte despre efecte grave dăunătoare ale administrării unei cantități mari de 30 30 comprimate.

. Dacă luați comprimate în același timp ai luat, poți să ai probleme să suferi de greață, vărsături sau sângerare vaginală. Chiar fetele care încă nu menstrua pot vaginal sângerare obține dacă ele pe accident acest medicament au luat.

Ați uitat acest medicament să utilizați?

Dacă aveți mai puțin de 12 ore întârziere cu administrarea medicamentului de un comprimat, efectul medicamentului nu este scăzut . Luați acel comprimat totuși cât mai curând posibil în după ce la gândește și ia următoarele tablete din nou la ora obișnuită în. Dacă

mai mult de 12 ore târziu ești cu administrarea medicamentului de un comprimat, poate efectul funcționării a pilulei scăzut fi. Cu cât mai multe comprimate ați uitat consecutiv uitat ați fost, cu atât mai mare devine efectul șansa că de eficacitatea a pilulei scăzută este. șansa de protecție insuficientă împotriva sarcinii este cea mai mare dacă tabletele sunt omise omisă la începutul sau la sfârșitul benzii din banda. De aceea se aplică următoarele reguli (vezi de asemenea schema): Mai mult de 1 comprimat

uitat în această bandă Contactați

Vă rugăm să luați legătura cu dumneavoastră medic.

1 tabletă uitat în săptămâna 1

Luați uitată tabletă imediat ce vă gândiți la aceasta, chiar dacă aceasta ar însemna că ați lua două comprimate pe același moment trebuie să luați. Luați în continuare comprimatele din nou la obișnuit ora de administrare, dar trebuie de asemenea timp de 7 zile extra contraceptive utilizați. Dacă în săptămâna înainte de de uitat comprimatul sex ați avut puteți să fiți însărcinată . Luați în acel caz de aceea imediat imediat contactați medicul dumneavoastră medicul.

1 tabletă uitat în săptămâna 2

Luați uitată tableta imediat ce vă gândiți ,chiar dacă acest lucru ar însemna că acel dumneavoastră două tablete la același moment trebuie să luați. Luați în continuare tabletele din nou la ora obișnuită în. Efectul pilulei este eficacitatea pilulei este nu redus, dumneavoastră nu trebuie niciun suplimentar contraceptive să utilizați.

1 comprimat uitat în săptămâna 3

Puteți alege din două opțiuni posibilități:

1. Luați uitată comprimatul de îndată ce vă aduceți aminte ,chiar dacă aceasta ar însemna că trebuie să luați două comprimate în același moment trebuie trebuie a lua. Luați mai departe comprimatele comprimatele din nou la obișnuită oră în. Săriți în plus perioada fără comprimate peste și continuați imediat cu următoarea următoarea strip.
Cel mai probabil veți primi doar la sfârșitul sfârșitului celei de-a doua strip o adevărată sângerare de întrerupere, dar puteți avea în timpul celei de-a doua strip totuși last a primi de spotting sau un sângerare de întrerupere.
2. Puteți să de asemenea opriți cu respectiva folie și după o perioadă fără tablete de 7 zile zile (tel bine întotdeauna de zi cu în care ați uitat să luați comprimatul)continuați cu următorul blister. Dacă în ziua dumneavoastră fixă de începere cu cu un nou strip doriți să începeți, puteți un perioadă fără tablete de mai puțin de 7 zile menține.

Dacă ați un strip tablete uitat și dumneavoastră u primește niciun sângerare în următoarea normală perioadă fără tablete poate însemna că sunteți gravidă. Trebuie să contactați cu medicul dumneavoastră pentru a dumneavoastră medic înainte de dumneavoastră să continuați cu următorul blister. Ce trebuie

să faceți în cazul de vărsături sau diaree severă Dacă în decurs de

Dacă dumneavoastră înăuntru 3-4 ore după administrarea administrării unui unui comprimat trebuie să vomitați, sau diaree severă aveți, există o posibilitate că substanța activă substanțe nu complet în corp sunt absorbite. Această situație este comparabilă cu uitarea unei tablete. După

vărsături sau de diaree trebuie să repede posibil un nou comprimat din un blister de rezervă luați. Dacă posibil în 12 ore după ce timpul la care dumneavoastră normal dumneavoastră pastila luați. Dacă acest lucru nu posibil este, sau dacă cele 12 ore deja au trecut ,trebuie trebuie u sfatul urmați așa cum mai sus indicat la 'Ați uitat acest medicament să utilizați? '.

Amânarea menstruației : cetrebuie să știți știți

U puteți vă menstruația amâna prin fără perioadă fără comprimate continua să mergeți cu un nou blister Microgynon 30. Puteți să continuați cu acest strip continua până când toate tabletele sunt consumate sau dacă doriți mai devreme opriți. Puteți să în timpul utilizării

utilizării acestui al doilea strip bine ultim au de sângerare de întrerupere sau spotting. După obișnuită fără tablete perioadă de 7 zile începeți din nou cu următorul strip. Ziua

de început începutul zilei de dumneavoastră menstruație schimba: ce trebuie să știți

Dacă dumneavoastră comprimatele conform instrucțiunilor luați , atunci dumneavoastră menstruația întotdeauna la aproximativ aceeași zi începeți. Dacă această zi doriți schimbați, atunci puteți să faceți asta prin perioada normală fără tablete perioadă între două benzi să scurta (dar niciodată prin a prelungi). De exemplu dacă menstruația normal pe vineri începe și doriți ca în viitor să mutați către către marți (3 zile mai devreme) decât trebuie să începeți acum cu 3 zile mai devreme decât de obicei cu noua folie începeți. Dacă perioada fără comprimate este foarte scurtă face (de exemplu 3 zile sau mai puțin) poate să se întâmple că dumneavoastră în timpul acestei perioade fără tablete perioade nu sângerare veți avea. Dumneavoastră puteți atunci în timpul următorului ciclu puteți avea probleme cu sângerare de descoperire sau spotting.

Dacă opriți utilizarea acestui medicament acest medicament

Puteți aveți cu Microgynon 30 opriți când doriți. Dacă nu să rămâneți gravidă doriți să rămâneți, cereți atunci medicul dumneavoastră pentru sfaturi cu privire la alte de încredere metode de contracepție.

Dacă opriți pentru că doriți să rămâneți însărcinată doriți să deveniți, se în general recomandat să așteptați până când u un naturală menstruație ați avut înainte să încercați să rămâneți însărcinată . Puteți atunci mai ușor calcula când a veți de naștere va avea loc.

Aveți dumneavoastră alte întrebări despre utilizarea acestui medicament ? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul . 4..

4. Posibile efecte secundare

Ca fiecare medicament poate acest medicament avea efecte secundare, deși nu toată lumea se confruntă cu . Aveți un efect secundar, mai ales dacă acesta grav de natură este și mult timp persistă, sau apare o schimbare în dumneavoastră stare de sănătate din care dumneavoastră credeți că aceasta poate provoca poate fi cauzată de Microgynon 30? Contactați medicul dumneavoastră.

Toate femeile care utilizează hormonale contraceptive combinate utiliza, au un risc mai mare de cheaguri de sânge în vene (tromboembolism venos [VTE]) sau cheaguri de sânge în artere (tromboembolism arterial [ATE]). Vezi pentru mai multe informații despre diferitele riscuri ale utilizării de contraceptive hormonale combinate secțiunea 2 'Când trebuie să fiți precaut sunt cu acest medicament?'

Reacții adverse grave Reacții adverse

grave care sunt asociate cu utilizarea pilulei în legătură au fost raportate sunt descrise în ' descrise Cheaguri de sânge (tromboză)' și 'Microgynon 30 și cancer'. Citiți aceste paragrafe pentru mai multe informații și consultați imediat medic dacă necesar.

Contactați imediat dumneavoastră medic dacă aveți simptome de angio-edem apare cum ar fi un umflat față, limbă și/ sau gât enof probleme cu înghițirea sau urticarie posibil împreună cu

probleme cu respirația (vezi de asemenea rubrica 2: 'Când trebuie să fii suplimentar precaut fiți cu acest medicament?').

Alte posibile efecte secundare

Următoarele efecte secundare sunt menționate de utilizatoarele de pilule. Efecte secundare pot apărea în primele câteva luni de la utilizarea pilulei. Uneori apar efecte secundare care pot dispărea după o anumită perioadă de la sine.

Adesea întâlnite efecte secundare (apar la 1 până la 10 din 100 utilizatoare):

- stare depresivă, schimbare de dispoziție
- durere de cap
- greață, durere abdominală
- durere în sâni, sensibili sâni
- creștere în greutate.

Uneori apariția efectelor secundare (apar la 1 până la 10 din 1.000 utilizatoare):

- libidoului (dorința de sex)
- migrenă
- vărsături, diaree
- erupție cutanată, erupție cutanată cu mâncărime intensă și formarea de umflături
- creșterea retenției sângelui
- de de la lichid.

Rareori apar efecte secundare (apar la 1 până la 10 din 10.000 utilizatoare):

- creșterea
- libidoului (dorința de sex) iritație
- iritație de ochi la utilizare de lentile de contact
- formă de erupție cutanată cu dureroase noduli albaștri-roșii, formă de erupție cutanată în care există de asemenea de asemenea vorbește poate fi de noduli, vezicule sau retenție de lichide
- vaginal secreție, secreție din mamelon scădere în greutate
- dăunătoare
- cheaguri de sânge în un venă sau arteră, de exemplu:
 - o în un picior sau laba piciorului (adică. tromboză venoasă profundă)
 - o în un lung (d.w.z. embolie pulmonară)
 - o infarct miocardic
 - o accident vascular cerebral
 - o 'mini-accident vascular cerebral' sau temporare simptome precum în un accident vascular cerebral, cunoscut ca TIA (tranzitorie ischemică atac)
 - o cheaguri de sânge în ficat, stomac/intestine, rinichi sau ochi.

Probabilitatea de a avea un cheag de sânge este mai mare dacă există alte condiții care vă se aplică sunt care acest risc crește (vezi secțiunea 2 pentru mai multe informații despre condiții care risc de cheaguri de sânge cresc și simptomele unui cheag de sânge).

Următoarele grave efecte secundare sunt ceva mai frecvente mai des** raportat la femeile care au pilulă contraceptivă utilizat, dar nu este cunoscut dacă acest este cauzat de tratament (vezi rubrica 2: 'Când trebuie să fii extra atent cu acest medicament?').

- tumori hepatice sau

- cancer de sân Următoarele afecțiuni

sunt de asemenea în sunt de asemenea în bandaj adus cu pilule combinate:

Boala Crohn, colita ulceroasă ,porfirie (boală metabolicăcare dureri abdominale și afecțiuni mentale cauzează),), sistemică lupus eritematos (în care corpul atacă propriile organe și țesuturi și le deteriorează), herpes la sfârșitul de la sfârșit sarcină, coreea Sydenham (rapid involuntar spasmodic sau convulsiv mișcări), hemolitic uremic sindrom (o afecțiune care apare după diaree care cauzate este de E.coli), probleme hepatice care vizibile devin prin icter.

Raportarea reacțiilor adverse a efectelor secundare

Aveți simptome de efecte secundare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul. Acest se aplică de asemenea pentru posibilele efecte secundare care nu în acest prospect sunt menționate. Puteți raporta efectele secundare de asemenea direct raporta prin Olanda Efecte secundare Centrum Lareb, site web www.lareb.nl. Prin efecte secundare a raporta, puteți să ne ajutați să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament . medicament.

5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?

Păstrați sub 30°C.

A nu se lăsa la vedere și la îndemâna copiilor a nu se lăsa ..

acest medicament medicament nu mai după de data de expirare. Aceasta este de găsit pe ambalaj și blister după 'EXP'. Acolo este o lună și un an. ultima zi a acelei luni este data limita de expirare.

Nu aruncați medicamentele nu în chiuvetă sau în toaletă și aruncați le nu în coșul de gunoi. Întrebați pe farmacistul ce să faceți cu medicamentele trebuie să faceți pe care nu le mai utilizați. Ele sunt apoi un responsabil mod distrus și ajung nu în mediu ajung.

6. Conținutul al ambalajului și alte informații

Ce substanțe sunt în acest medicament?

Substanțele active în acest medicament sunt levonorgestrel și etinilestradiol . Fiecare comprimatMicrogynon 30 30 0,030 miligrame etinilestradiol și în 0,150 miligram levonorgestrel.

De alte substanțe în acest medicament sunt lactoză monohidrat, amidon de porumb, povidonă 25 (E1201), stearat de magneziu (E470B), zahăr, povidonă 700.000, polietilenglicol 6.000, carbonat de calciu (E170), talc (E553b), ceară de montanglicol (E192), dioxid de titan (E171), glicerină 85% (E442) și pigment de oxid de fier (galben, E172).

Cum arată Microgynon 30 și cât de mult este în un ambalaj?

Comprimatele Microgynon-30 sunt comprimate filmate ; miezul comprimatului este acoperit cu un strat protector . Comprimatul este galben . Un.

Un ambalaj Microgynon 30 conține 3 benzi, fiecare cu 21 comprimate.

Deținător al autorizației pentru punerea pe piață și producător Deținător

al autorizației pentru punerea pe piață comerț aduce

Bayer B.V.

Siriusdreef 36

2132 WT Hoofddorp

Producător

Bayer AG

Müllerstraße 178

13353 Berlin, Germania

Bayer Weimar GmbH und Co. KG

Doebereinerstrasse 20

99427 Weimar, Germania

Pentru informații:

Bayer B.V., Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp,

În registru înregistrat sub RVG 08204

Acest prospect este pentru ultima dată aprobat în iulie 2025.